



NUTRICION VEGETAL

## BROADACRE Zn Cu

Floable

Producto registrado RSCO 107/III/07

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

	%p/v
Zinc (Zn)	60.0%
Cobre (Cu)	15.0%
Extracto de origen vegetal	5.9%

Densidad 1.70 gr. /cm<sup>3</sup> Agente quelatante: algas marinas

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fertilizante en solución para uso foliar, fertirrigación y tratamiento de semilla con rápido secado en TS.

### RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis	Recomendaciones/época de aplicación
Algodón, Arroz, Maíz, Frijol, Trigo	150 a 400 ml/ha	Aplicar en el momento de la plantación, dirigido al surco, diluido entre 50 a 400 L de agua/ha.
Germinación de Hortalizas	aplicar de 10 a 50 ml por 1000 m <sup>2</sup> de superficie	Aplicar en el área total, antes de la siembra o inmediatamente después.
Flores Ornamentales	de maceta: 1 a 2 ml/cm <sup>3</sup>	Aplicar directamente a la maceta con el sustrato, puede diluirse en agua o puede ser directo.
	para corte: 10 a 100 ml/1000m <sup>2</sup>	Aplicar en el suelo del área total a tratar, puede aplicarse directo o diluido en agua, dependiendo del equipo de aplicación.



## NUTRICION VEGETAL

Frutales	15 a 20 ml/planta	Aplicar en el suelo de manera directa o asperjada en la copa de la planta. Diluir en un máximo de 200ml de agua.
Nogal	500-750ml	Aplicar en cuanto exista crecimiento de brotes, repetir a los 7 días.
Caña de azúcar	300 a 500 ml/ha	Aplicar en el suelo dirigido en el surco de plantación.
Hortalizas	300 a 500 ml/ha	Aplicar en el surco al follaje, en el momento de la plantación. Diluir en agua entre 50 a 400 L/ha.
Tratamiento de semilla	300 a 400 ml	Tratamiento para 50Kg de semilla.

**Importante:** en fertirrigación, las dosis pueden cambiar conforme a las necesidades del cultivo en cada una de las fases de desarrollo.

### CONSIDERACIONES DE USO Y APLICACIÓN

Agite bien el producto antes de utilizar.

Colocar agua en el tanque hasta la mitad.

Agregué la cantidad necesaria de **BROADACRE Zn Cu**, luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta el tiempo de la aplicación.

Prepare la solución con **BROADACRE Zn Cu** el mismo día de la aplicación.

No almacene **BROADACRE Zn Cu** diluido en agua.